



לשימוש  
מטל  
חצי שנה

- משך כאבים ומוריד חום
  - פועל בתוך כ- 15 דקות
  - יעיל עד 8 שעות
  - חצי הכמות, אותה היעילות\*
- \*בהשוואה לאיבּו 2% לילדים

## טבלת מינונים לפי גיל:

## טבלת מינונים לפי משקל:

מנה במ"ל	גיל הילד	מנה במ"ל	משקל גוף (ק"ג)
לפי מרשם רופא	3-6 חודשים	1 מ"ל	5-5.4
1.25 מ"ל	6-11 חודשים	1.25 מ"ל	5.5-8.1
1.75 מ"ל	12-23 חודשים	1.75 מ"ל	8.2-10.9
2.5 מ"ל	2-3 שנים	2.5 מ"ל	11-15
3.75 מ"ל	4-5 שנים	3.75 מ"ל	16-21
5 מ"ל	6-8 שנים	5 מ"ל	22-26
6.25 מ"ל	9-10 שנים	6.25 מ"ל	27-32
7.5 מ"ל	11-12 שנים	7.5 מ"ל	33-43

הטבלאות מציינות מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא. תרופה זו אינה מועדת לתינוקות מתחת לגיל 3 חודשים או ששוקלים פחות מ-5 ק"ג. לתינוקות בניגילאי 3-6 חודשים השימוש עפ"י מרשם רופא בכדב.

**רק במקרה שלא ידוע משקל הילד** - יקבע המינון על פי גיל הילד כפי שמופיע בטבלת הגיל.

**מספר מנות מקסימלי ליממה** - עד 4 פעמים ביממה, ככל 6-8 שעות, בהתאם לצורך.

**טבלת מינונים לפי גיל** - ילדים בניגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי, וכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד ורקבוע מינון כפי טבלת משקל הגוף. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלת הגיל.