

## **מבצע החיסון " 2 טיפות" חיסון חי-מוחלש - bOPV**

**הנחיות למדוכאי חיסון והבהרות - 21.08.2013**

משרד הבריאות מבהיר בזאת שאין חשש משיבוש אורח החיים הקבוע והרגיל של האוכלוסייה בתקופת מבצע החיסון "שתי טיפות".

לשם זהירות מונעת, ההנחיות הן שלא לחסן בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית, סובל מדיכוי חיסוני, בתקופה המוגדרת של דיכוי חיסוני.

אחיות טיפות חלב תודרכו לבצע תשאול ולאתר ילדים בקבוצה זו ולהימנע מחיסונם.

יודגש כי מי שבעבר סבל מדיכוי חיסוני אינו נחשב למדוכא חיסון כיום.

## **הנחיות להתנהגות של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני**

**ניתן לחלק את הסובלים מדיכוי חיסוני ל-3 קבוצות:**

1. הרוב המכריע של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני אינם מצויים בסיכון יתר כתוצאה מחשיפה אפשרית לחיסון החי המוחלש, שכן במרבית המצבים של דיכוי חיסוני הזיכרון החיסוני מספיק כדי להתמודד עם נגיף חי מוחלש.
2. ילדים או מבוגרים לאחר השתלת מח עצם שטרם חוסנו מחדש או סובלים מלאוקמיה פעילה או מחלת סרטן המטופלת בטיפול כימותרפי לתקופה של בין 3 עד 6 חודשים מתום הטיפול - בקבוצה זו הזיכרון החיסוני להתמודדות עם נגיף חי מוחלש אינו ודאי.
3. חולים עם חסר גאמא גלובולין בדם, או תת גאמא גלובולין משמעותית נחשבים למדוכאי חיסון לנושא החיסון החי מוחלש נגד פוליו, גם אם מקבלים טיפול קבוע ב- IVIG.

בכל מקרה של ספק לגבי חומרת הדיכוי החיסוני יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

### הנחיות לכלל 3 הקבוצות, ובמיוחד לקבוצות 2 ו-3:

- א. מומלץ להימנע ממגע הדוק עם הפרשות (צואה, רוק) של ילדים שקיבלו את החיסון החי-מוחלש לתקופה של עד 6 שבועות ממועד קבלת החיסון.
- ב. הקפדה ביתר שאת, על רחיצת ידיים (לפני מגע עם אוכל, לאחר יציאה מהשירותים והחלפת חיתולים) כפי שמומלץ לכלל הציבור.

יודגש כי בשל העובדה שהחיסון החי-המוחלש אינו מועבר באמצעות אוויר, מים או מזון אין מניעה מניהול חיי שגרה, כולל יציאה למסעדות, אירועים וארוחות משפחתיות.

אין מניעה מלרחוץ בבריכות שחיה המאושרות על ידי משרד הבריאות.

### שהייה במוסדות חינוך ובריאות

ילדים מקבוצה 1 - יכולים להשתתף במסגרות חינוכיות (קייטנות, גנים ובתי ספר) כבשגרה.

#### ילדים מקבוצה 2 -

- ילדים הסובלים מלאוקמיה פעילה או מחלת סרטן: יכולים להשתתף במסגרות חינוכיות במידה שהם קיבלו בעברם לפחות 3 מנות של חיסון מומת.
- מושתלי מח עצם: יכולים להשתתף במסגרות חינוכיות במידה והם קיבלו לפחות 3 מנות של חיסון מומת לאחר ההשתלה.

ילדים מקבוצה 3 – לא ישתתפו פיזית במסגרת הגן או הביה"ס עד 6 שבועות אחרי סיום מבצע החיסון: בכיתת ביה"ס - אם כל הילדים בכיתה חוסנו, ניתן לחזור. במסגרת הגן - אם כל הילדים בגן חוסנו, ניתן לחזור.

**אין מניעה שגננות, מורות ומטפלות עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרן, תוך הקפדה על הכללים א' וב' שפורטו לעיל.**

**אין מניעה שאנשי צוות רפואי עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרם, תוך הקפדה על הכללים א' וב' שפורטו לעיל.**

**חזרה והרחבה של הבהרות קודמות שפורסמו ב- 12.8.2013**

**הריון, ילודים ותינוקות עד גיל חודשיים<sup>1-3</sup>**

**האם ניתן לחסן ילדים בבית בו יש נשים בהריון?**

**תשובה\*:** אפשר לחסן ילדים המועמדים לחיסון חי-מוחלש (bOPV) כאשר יש נשים בהריון בבית הן במועד החיסון והן לאחריו. חיסון האחים הגדולים ימנע את הדבקתם בנגיף הפוליו הפראי, וכך גם הילודים יהיו מוגנים. הילודים בעצמם מוגנים במשך חצי השנה הראשונה לחיים בשל העברת נוגדנים אימהיים נגד פוליו דרך השליה במהלך השליש האחרון של ההיריון.

**האם מותר לחסן ילדים עם אחאחים בני פחות מחודשיים שלא קיבלו חיסון מומת?**

**תשובה\*:** אין מניעה מלחסן ילדים עם אחים מתחת לגיל חודשיים בבית. חיסון האחים הגדולים ימנע את הדבקתם בנגיף הפוליו הפראי, וכך גם התינוקות יהיו מוגנים. התינוקות בעצמם מוגנים במשך חצי השנה הראשונה לחיים בשל העברת נוגדנים אימהיים נגד פוליו דרך השליה במהלך השליש האחרון של ההיריון.

**\*כמו תמיד, מומלצת שמירה על היגיינה אישית של כל בני הבית ע"י רחיצת ידיים עם מים וסבון, במשך לפחות 20 שניות, בפרט במצבים הבאים: לאחר שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן אחרי החלפת חיתול.**



**מחקרים בנושא:**

- 1. Linder N, Taushtein I, Handsheer R, Ohel G, Reichman B, Barzilai A, Kuint J, Davidovitch N, Mendelson E, Dagan R. Placental transfer of maternal poliovirus antibodies in full-term and pre-term infants. *Vaccine*. 1998;16(2-3):236-9.**
- 2. Ornoy A, Ben Ishai P. Congenital anomalies after oral poliovirus vaccination during pregnancy. *Lancet*. 1993;341(8853):1162.**
- 3. Ornoy A, Arnon J, Feingold M, Ben Ishai P. Spontaneous abortions following oral poliovirus vaccination in first trimester. *Lancet*. 1990;335(8692):800.**