

## פרק "מניעה ופיקוח על זיהומים הנגרמים ע"י המופילוס אינפלואנזה ב", עדכון 2012

### עדכונים בכל הפרק:

- עריכת הפרק
- הורדת מידע על התרכיבים שלא נמצאים בשימוש בישראל

### עמוד Hib 1-2

- עדכון המלצה למתן חיסון נגד Hib למועמדים לכריתת טחול:  
המלצה מעודכנת:  
יש לשקול מתן מנה נוספת של החיסון (לאחר התייעצות עם הרופא המטפל) לאדם שחוסן באופן מלא. רצוי לחסן את המועמד 7-10 ימים לפני כריתת הטחול.
- הוספת המלצה לרווח זמן מינימלי בין מנות התרכיב שניתן אחרי גיל 12 חודשים: 8 שבועות (חודשיים)
- הוספת מידע על תרכיבים נגד Hib הרשומים בישראל.
- עדכון הנחיה למתן חיסון נגד Hib לבני 15-59 חודשים:  
2 מנות ברווח זמן של 8 שבועות במקום מנה אחת
- הוספת הנחיה למתן חיסון נגד Hib לילדים ולמבוגרים עם זיהום HIV או עם חסר IG2:  
מומלץ על מתן 2 מנות חיסון ברווח זמן של 1-2 חודשים ביניהן.
- עדכון הנחיה למתן חיסון לילדים מתחת לגיל 24 חודשים שחלו בזיהום פולשני ע"י Hib.  
הוספת הגדרה: "חיסון מלא נגד Hib".

### עמוד Hib 3

- עדכון מקום הזרקת תרכיבים נגד Hib בהתאם לגיל הילד

### עמוד Hib 4

- "מחלה חדה מלווה חום" הועברה מקטגוריה "הורית נגד" לקטגוריה - "אזהרה".
- עדכון רשימת תופעות הלוואי לאחר מתן החיסון.
- הוספת מידע על חליפיות בין תרכיבים נגד Hib.

### עמוד Hib 5-6

- החלפת מונח "טיפול כימותרפיה" ל-"טיפול תרופתי מונע".
- הוספת מידע מפורט על תכשיר rifampicin.
- עודכנה רשימת המועמדים לקבלת טיפול מונע בביתו של החולה, במעון ובגן ילדים.
- הורחבה רשימת מועמדים למתן טיפול מונע למגעי גן ילדים בהתאם להמלצות של ה-CDC ומומחים בישראל.
- עדכון מתן טיפול מונע לחולה.
- עדכון עיתוי מתן טיפול תרופתי מונע למגעי החולה.