



# חוזר המנהל הכללי

מס' 1/10 תאריך י"ז טבת תש"ע (3.1.2010)

**נושא:** מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1, שלב ב' - תוספת (13)

## רקע

חוזר זה מהווה עדכון ותוספת לחוזר מנכ"ל מספר 47/09 מיום 13.12.09 (מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית 2009 A/H1N1, שלב ב'), אשר ימשיך להוות מסמך אב למבצע החיסונים.

## להלן העדכונים והתוספות לחוזר 47/09:

1. החל ממועד פרסום חוזר זה, ניתן לתת את התרכיב מסוג Panenza לכל האוכלוסייה, החל מגיל 1/2 שנה ומעלה.

2. אופן השימוש בחיסון יהיה בהתאם להנחיות הבאות:

### 2.1 מינון:

- 0.25 מ"ל למנה לגילאים 6 חודשים עד 36 חודשים (כולל).
- 0.5 מ"ל לילדים מעל גיל 36 חודשים ולמבוגרים, לרבות נשים הרות.

### 2.2 מספר המנות בסדרת חיסון:

- גיל 6 חודשים עד 36 חודשים: שתי מנות של 0.25 מ"ל ברווח זמן של לפחות 3 שבועות ביניהן
- גיל מעל 36 חודשים (מעל 3 שנים) ועד גיל 10 שנים (עד ליום ההולדת ה-10): שתי מנות של 0.5 מ"ל ברווח זמן של לפחות 3 שבועות ביניהן.
- ילדים החל מגיל 10 שנים ומבוגרים, לרבות נשים הרות: מנה אחת של 0.5 מ"ל.

3. ילדים אשר חוסנו במנה ראשונה של התרכיב Pandemrix וטרם קיבלו את המנה השנייה של החיסון, יחוסנו במנה שנייה של Pandemrix, שכן בשלב זה אין נתונים על חליפיות בין חיסונים שונים כנגד שפעת A/H1N1 2009.
4. עדכון לגבי תנאי האחסון של התרכיב Panenza : יש לאחסן את התרכיב במקרר רגיל, בטמפרטורה של בין  $2^{\circ}$  ל- $8^{\circ}$  צלזיוס. אם התרכיב נחשף בטעות לטמפרטורות חריגות עד  $25^{\circ}$  צלזיוס למשך פרק זמן מצטבר של עד 72 שעות, אפשר להשתמש בתרכיב.
5. דיווח תופעות לוואי : בניגוד לאמור בחוזר מספר 47/09, בשלב זה יש לדווח על תופעות לוואי ללשכות הבריאות בלבד ובאמצעות הטופס הייעודי שסופק על ידי משרד הבריאות.
6. ככלל, מבצע החיסון ימשיך להתבצע בהתאם להנחיות המקצועיות המפורטות בחוזר מנכ"ל מספר 47/09. יש להדגיש כי למעט נשים הרות וילדים עד גיל 3 אותם יש לחסן בתרכיב Panenza בלבד, וילדים בגיל 3 עד 10 שנים אותם יש לחסן בתרכיב Panenza או Pandemrix בלבד, ניתן לתת למטופלים את כל אחד מסוגי החיסונים המצויים בשימוש בישראל. עד הגעת Panenza לכל המקומות, מומלץ להמשיך עם החיסונים הקיימים. כל החיסונים יעילים ובטוחים.

בכבוד רב,



ד"ר איתן חיי-עם

העתק : ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות  
לת/210329