

## סיכום צט"מ - טיפול בילודים לנשים חשודות / חולות בקורונה

**פרופ' דרור מנדל** - מנהל ביה"ח לילדים דנה דואק מנהל מחלקת פגים וילודים  
**דר' דינה צימרמן** - מנהלת המחלקה לאם וילד משרד הבריאות  
**דר' גילת ליבני** - מנהלת מחלקת ילדים א' שניידר  
**פרופ' צחי גרוסמן** - מכבי שירותי בריאות, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים אוניברסיטת אריאל  
**פרופ' אעמד קסיס** - מנהל מחלקת ילדים ויחידה למחלות זיהומיות ילדים רמב"ם  
**פרופ' דודי גרינברג** - יו"ר חטיבת ילדים ומנהל היחידה למחלות זיהומיות ילדים- סורוקה

### 1. יולדת חשודה (בבידוד ללא סימפטומים):

- 1.1. התינוק ישהה עם אימו בבידוד. ניתן להניק
- 1.2. אם התינוק מדרדר וזקוק להשגחה:  
 - לקיחת בדיקה SARS-CoV-2 לאמא ולילוד.  
 - הילוד ישהה בתינוקיה / פגיה בבידוד עד קבלת תשובה שלילית ל- SARS-CoV-2
- 1.3. אם האמא מפתחת סימנים נשימתיים לאחר הלידה -  
 - אם יציבה ומסוגלת לטפל בתינוק: הילוד ישאר עם האם  
 - אם לא מסוגלת לטפל בילוד – לתינוקיה/פגיה.
- 1.4. הבידוד לילוד במקרה זה – בידוד מגע-טיפתי, לא אווירני
- 1.5. במידה והילוד מופרד מאימו - יש לדאוג למתן חלב אם שאוב לילוד (הדרכת היולדת לשטיפת ידיים, מסיכה).
- 1.6. יילוד מונשם – בחדר בידוד אווירני, במידת האפשר – לחץ שלילי.

### 2. יולדת חשודה סימפטומטית (סימפטומים + אפידמיולוגיה):

- 2.1. לקיחת בדיקה ליולדת בחדר לידה (החלטת רופא מיילד). הפרדת הילוד מהיולדת עד קבלת תשובה.
- 2.2. אם התשובה של האמא שלילית – חוזרת לנוהל יולדת בבידוד כמצוין בסעיף 1, וידוא מעקב הולם אחר הילוד לאחר שחרורו (צהבת וכד').
- 2.3. אם התשובה של האמא חיובית – יש לקחת בדיקה לילוד:  
 א. ילוד חיובי: חזרה אל האמא. אם אין אפשרות – הילוד בבידוד מגע-טיפתי.  
 ב. ילוד שלילי: הפרדה של הילוד מאימו עד שהאמא עונה על הקריטריונים שהיא בריאה (2 בדיקות בהפרש של 24 שעות).
- 2.4. במצב שהאם חיובית והילוד שלילי ואסימפטומטי, על רופא הילדים להסביר ליולדת את הסיכון הנמוך מאד לתחלואה של הילוד מחד לבין המשמעויות של הפרדה מאיך (העדר מגע עור לעור וסיכון התבססות של חלב אם) ולהיערך להמשך טיפול על פי בחירתה של היולדת (הפרדה או ביות rooming in).
- 2.5. אמא חיובית הרוצה rooming in - יש לוודא הפרדה של 2 מטר בין עריסת הילוד לאימו, הנקה עם מסיכה.
- 2.6. תינוק ששוחרר ומגיע מהבית באם מדרדר – יש לבצע בדיקת SARS-CoV-2.



### שחרור יולדות וילוד:

- ניתן לאפשר שחרור מוקדם כל עוד מוודאים קיום המעקב הנדרש אחר היילוד, ביצוע בדיקות סקר וצהבת ומתן תמיכה הולמת להנקה / קבלת חלב אם.
- מעקב צהבת לילוד יעשה באשפוז לפי הנוהל הרגיל ואם יש צורך המשך מעקב קהילה יעשה על פי הנהלים הרגילים ע"י בן משפחה שלילי לקורונה.