

מוזכירת האיגוד : גבי שירית בן אריה

טל : 03-9253680, E-mail: [shiritbn@gmail.com](mailto:shiritbn@gmail.com)

אפריל 2019

**דף מידע להורים בנושא החיסון נגד חיידק המנינגוקוקוס מסוג B**

הורה יקר,

- לאחרונה אישר משרד הבריאות לשימוש בישראל חיסון נגד חיידק המנינגוקוקוס B והמליץ על מתן החיסון, במיוחד לחולים עם הפרעה במערכת החיסון וכן לילדים בגילאי חודשיים עד שנתיים, כאשר ניתן לחסן גם בגיל מבוגר יותר.
- מתוך דאגה לבריאות ילדי ישראל – האיגוד הישראלי לרפואת ילדים מאמץ המלצה זו, כפי שעשו גם גופי בריאות אחרים בארץ ובעולם.
- החיסון אינו כלול בסל הבריאות ואינו ניתן בתחנות טיפת חלב של משרד הבריאות או של העיריות.
- החיסון זמין בתשלום, המסובסד בחלק מקופות החולים לבעלי ביטוח משלים. הרופא המטפל שלכם ישמח לתת לכם מירשם והפניה לקבלת החיסון.
- להלן מספר הבהרות ותשובות לשאלות שכיחות לגבי המחלה והחיסון:

**1. מהי מחלה מנינגוקוקית?**

חיידק המנינגוקוקוס (בשמו הלועזי Neisseria meningitidis), הנמצא באף ובלוע של חלק מן האנשים מבלי לגרום למחלה (כ-10% מהמבוגרים ו-25% מהמתבגרים), עלול לגרום למחלה בלתי שכיחה אך חמורה ומסוכנת הכוללת דלקת קרום המוח, אלח דם וזיהומים פולשניים נוספים. המנינגוקוק מועבר ע"י הפרשות מדרכי הנשימה של חולה. קיימים מספר זנים של החיידק, אך רוב המחלות המנינגוקוקיות בתינוקות בישראל נגרמות ע"י זן B.

**2. מי יכול לחלות במחלות מנינגוקוקית?**

מחלה מנינגוקוקית יכולה להופיע בכל גיל אך שיעורי המחלה הגבוהים במיוחד הם בתינוקות ובפעוטות עד גיל שנתיים. אנשים הסובלים מהפרעות במערכת החיסון – כגון בעיות בטחול, במערכת המשלים או זיהום בנגיף האיידס (HIV) – מצויים בסיכון גבוה למחלה מנינגוקוקית חמורה.

### **3. למי מומלץ החיסון?**

החיסון מומלץ במיוחד לאנשים בקבוצות הסיכון וכן לפעוטות בגיל חודשיים עד שנתיים. אנשים המעוניינים בהגנה נגד מחלה מנינגוקוקית הנגרמת על-ידי זן B יכולים לקבל את החיסון בכל גיל.

### **4. מהו החיסון המומלץ?**

כיום רשום בישראל תרכיב אחד בלבד בשם בקסרו (Bexsero). חיסון נוסף נמצא בהליך רישום.

### **5. מה יעילות החיסון נגד מנינגוקוק זן B?**

במדינות אחרות בהן ניתן החיסון, למשל בריטניה, נמצאה ירידה ניכרת בשיעורי התחלואה בחיידק זה. עפ"י בדיקה שנעשתה – מתן החיסון צפוי לגרום להגנה מפני זני מנינגוקוקוס B הנמצאים בישראל.

### **6. כמה מנות החיסון נדרשות?**

בתינוקות ללא גורמי סיכון מומלץ לתת שתי מנות בהפרש של חודשיים ומנת דחף לאחר לפחות 6 חודשים. בתינוקות עם גורמי סיכון המוחסנים לפני גיל חצי שנה – מומלץ לתת 3 מנות חיסון בהפרש של חודש ביניהן ומנת דחף לאחר 6 חודשים לפחות.

### **7. מה משך ההגנה מהחיסון?**

משך ההגנה של החיסון אינו ידוע בוודאות. מומחים מעריכים ששתי מנות מקנות הגנה ל-18 חודשים, ומנת דחף מעל גיל שנה מקנה הגנה ל-36 חודשים. אי לכך, צפוי שמתן התרכיב יגן על תינוקות ופעוטות בתקופת הסיכון הגבוהה ביותר לחלות.

### **8. האם ניתן לתת את התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים?**

בגלל השכיחות הגבוהה של חום כאשר ניתן יחד עם חיסוני שגרה מומלץ לתת בנפרד.

### **9. מהן הוריות הנגד והאזהרות לחיסון?**

אין לתת את החיסון למי שידוע כסובל מאלרגיה לאחד ממרכיבי החיסון או שפיתח תגובה אלרגית קשה (אנפילקטית) למנה קודמת של החיסון.

### **10. אילו תופעות לוואי מדווחות לאחר מתן החיסון?**

התופעה השכיחה ביותר בתינוקות ובפעוטות עד גיל שנתיים היא חום מעל 38 מעלות, במיוחד כאשר החיסון ניתן בו זמנית עם חיסוני שגרה. תופעות שכיחות נוספות: רגישות במקום ההזרקה, אי שקט, ירידה בתאבון, ישנוניות ובכי חריג. לאור נתונים אלה, משרד הבריאות ממליץ להפריד בשלושה ימים לפחות בין מתן חיסוני שגרה למתן חיסון זה בתינוקות בני פחות משנה, ובקבוצת גיל זו לתת טיפול מונע באקמול (פרצטמול) מיד לאחר מתן החיסון ושתי מנות נוספות בהפרש של 4-6 שעות, גם אם אין עלית חום.

מידע מפורט מופיע בעלון החיסון וכן באתר משרד הבריאות.