



שימוש בנרות Pramin® 5 mg (Metoclopramide) בילדים –

רענון הנחיה

- לאחרונה הגיעו למרכז לייעוץ תרופתי בבית חולים "אסף הרופא" מספר פניות בנוגע לשימוש בנרות Pramin® 5 mg (Metoclopramide) בילדים. פניות אלו עסקו במינון הנכון של נרות Pramin® בילדים.
- עקב כך, מצאנו לנכון לרענן את ההנחיות לרישום וניפוק Pramin® בישראל, על בסיס אזהרת הבטיחות של המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי במשרד הבריאות, שמופיעה במלואה בקישור:
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/Recall_drugs/DocLib1/Pramin.pdf
- להלן עיקרי הדברים בדגש על רישום נכון של התרופה בילדים:
 - אין להשתמש בתכשירי Metoclopramide בילדים מתחת לגיל שנה. מעל גיל שנה הטיפול לא יינתן כקו ראשון.
 - נרות של 5 מ"ג לא מיועדים לילדים ששוקלים פחות מ-30 ק"ג.
 - המינון המומלץ הינו 0.1-0.15 מ"ג/ק"ג משקל גוף למנה אחת, עד שלוש פעמים ביום.
 - המינון המקסימלי ליממה (24 שעות) הינו 0.5 מ"ג/ק"ג משקל גוף.
 - שימוש בתכשירי Metoclopramide מעל 5 ימים אינו מומלץ, פרט למקרים חריגים (כגון: Diabetic gastroparesis), בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל.
- הסיכונים העיקריים ברישום לא נכון של התרופה שעלול להוביל למנת יתר ולרעילות, הינם תופעות לוואי אקסטר-פירמידליות ותופעות לוואי לבביות כגון ירידת לחץ דם, התעלפויות (סינקופה), ברדיקרדיה, הארכת מקטע QT ועוד.